



نوشیدنی برای نوزادان و کودکان خردسال



شیر مادر بهترین نوشیدنی برای کودک شماست

نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می‌شوند در 6 ماه اول خود به نوشیدنی دیگری نیاز ندارند. شیر مادر یا شیر خشک نوزاد باید نوشیدنی اصلی در سال اول زندگی باشد.

هنگام از شیر گرفتن نوزاد، شیر مادر یا شیر خشک نوزاد را به عنوان نوشیدنی اصلی ادامه دهید. اگر نوزادان علاوه بر شیر به نوشیدنی نیاز دارند، باید به آنها آب جوشانده سرد شده (تا 6 ماهگی) داده شود.

همیشه هنگام تهیه شیر خشک برای نوزاد دقیق بیشتری داشته باشید و از دستورالعمل‌های سازنده پیروی کنید. توصیه فعلی آژانس استانداردهای غذایی این است که هر بار یک بطری شیر خشک تهیه کنید. بازدید کننده سلامت شما می‌تواند در این مورد به شما توصیه کند.

شما همچنین می‌توانید از آب بطری استفاده کنید، اما فقط در صورتی که میزان سدیم آن (گاهی اوقات به عنوان Na ذکر شده است) کمتر از 200 میلی گرم در لیتر باشد. قبل از تهیه خوارک، آب بطری نیز باید بجوشد.



فرمول حاوی سویا حاوی قندهایی است که می‌تواند باعث پوسیدگی دندان شود. شیرخشک سویایی فقط از 6 ماهگی مناسب است و تنها در صورت توصیه داکتر یا ویزیتور صحی شما باید به طفل داده شود. شیر خشک مرحله دوم نسبت به شیرخشک نوزاد مرحله اول هیچ مزیتی خاصی ندارد و در دسترس نیست.

انتخاب نوشیدنی‌های بدون قند برای کودک شما خواهد:

- عادات سالمی را برای زندگی تنظیم کنید
- کمک به جلوگیری از پوسیدگی در اولین دندان
- سلامت و تغذیه کلی کودک خود را بهبود بخشید
- لبخند کودکتان را خوب نگه دارید.



پیاله های جریان آزاد: یک قدم به جلو برای کودک شما

- پیاله های بدون نشت (دربیچه) شما را تشویق می کند بچه به مکیدن به جای جرعه و باید اجتناب شود. حرکت مکیدن می تواند به طور غیر مستقیم منجر به مشکلات گفتاری می شود.
- نوشیدنی هایی که از یک بطری گرفته می شوند احتمال بیشتری دارد منجر به مشکلات دندانی شود زیرا مایع تمایل دارد مدت بیشتری در دهان بماند نسبت به زمانی که از یک پیاله جرعه می نوشید.
- هدفتان این باشد که کودکتان فقط از آن بنوشد یک پیاله او دیگر از بطری استفاده نمی کنید. از اولین سالگره آنها

- یک پیاله جریان آزاد را در 6 ماهگی معرفی کنید.
- پیاله های جریان آزاد اجازه می دهند که آب چکه کند هنگامی که پیاله وارونه می شود خارج شود. اینها به صورت رایگان داده است توسعه بازدیدکننده سلامت شما به عنوان بخشی از برنامه لبخند کودکان





- هرگز نوشیدنی های شیرین را در بطری یا پیاله دریچه ندهید زیرا باعث پوسیدگی بسیار سریع دندان می شود.
- هرگز در آخر شب یا در طول شب اگر کودک از خواب بیدار شد، نوشیدنی های شیرین ندهید. سایر زمان های خطر برای نوشیدنی های شیرین بین خوراک غذایی، روی صندلی ماشین یا کالسکه یا به عنوان یک تسلی دهنده است.
- هرگز کودک خود را در طول روز و در زمانی که در رختخواب است با پیاله یا بطری تنها نگذارید، زیرا ممکن است خفه شود.

آب بهترین نوشیدنی بین خوراک های غذایی برای نوزادان تشنه و کودکان نوپا است.

مشاوره در مورد نوشیدنی های دیگر



آب

بعد از 6 ماهگی، آب بهترین نوشیدنی برای رفع تشنگی بین خوارک های غذایی است. از آب لوله کشی (به جای بطری) استفاده کنید. فقط در صورت لزوم به نوزادان زیر 6 ماه آب جوشیده سرد شده بدھید. از بازدیدکننده سلامت خود راهنماییں بخواهید.



شیر گاو

از سن 12 ماهگی می‌توانید دادن شیر گاو پاستوریزه پرچرب یا کم چرب را به عنوان نوشیدنی اصلی شروع نمایید. شیر کلسیم دارد، که برای داشتن استخوانهای قوی مهم است. شیرگاو پاستوریزه بدون چربی و ۱% نباید تا سن 5 سالگی به عنوان نوشیدنی اصلی به طفل داده شوند.



رس میوه تازه رقیق شده (یک قسمت رس به یک قسمت آب یا مقدار بیشتری آب در صورت لزوم)

این را می‌توان از سن 6 ماهگی فقط در هنگام خوارک های غذایی داد. رس میوه تازه رقیق شده منبع خوبی از ویتامین C است و بهتر است همراه با صبحانه یا خوارک غذایی اصلی کمک به جذب آهن مصرف شود. هرگز این نوشیدنی را بین خوارک های غذایی ندهید زیرا رس میوه های تازه اسیدی هستند و می‌توانند دندان های کودک شما را از بین ببرند. به یاد داشته باشید - هرگز رس میوه را در شیشه شیر ندهید.

نوشیدنی که توصیه نمی شود

☒ نوشیدنی های کودک

اگر آنها حتی آنها یکی که برچسب "ارگانیک" یا "سالم" دارند) حاوی قند هستند که می تواند باعث پوسیدگی دندان شود.

☒ آب های طعم دار

بیشتر آب های طعم دار حاوی شیرین کننده های مصنوعی هستند و بنابراین نباید به نوزادان و کودکان نوپا داده شود. بسیاری از این نوشیدنی ها حاوی قند هستند که می تواند باعث پوسیدگی دندان شود. این نوشیدنی ها همچنین تیزابی/اسیدی هستند و می توانند دندان های کودک شما را از بین ببرند.

☒ شیر طعم دار، میلک شیک و غذا های نرم متبنی بر شیر

اینها حاوی قند هستند و می توانند باعث پوسیدگی دندان شوند. هرگز این نوشیدنی ها را بین خوراک های غذایی یا طور آخرین چیزی مصرفی در شب، مصرف نکنید.

☒ شربت های رقیق شده و نوشابه های گازدار

اینها حاوی قند و شیرین کننده های مصنوعی هستند. توصیه نمی شود که این نوشیدنی ها را به نوزادان یا کودکان نوپا بدهید. اگر شربت های رقیق کننده داده می شود، به یاد داشته باشید که به خوبی رقیق شده تهیه کنید و فقط در زمان غذا نگه دارید.

☒ چای، چای گیاهی و کافی/قهوة (حتی بدون شیرینی)

این نوشیدنی ها برای نوزادان یا کودکان خردسال مناسب نیستند. آنها بر نحوه جذب آهن موجود در غذای طفلتان تاثیر می گذارند.

شیر ساده و آب لوله کشی
ایمن ترین نوشیدنی ها
برای دندان ها هستند.



برچسب ها را بخوانید - قندها را بررسی کنید!

برچسب را بررسی کنید و مراقب قندهای پوشیده باشید. اصلی ترین مواردی که باید به آنها توجه شود عبارتند از: گلوكوز، شربت گلوكوز، فروتكوز، رس میوه مرکز شده، سوکروز، دکستروز، عسل، شکر معکوس، مالتوز، نشاسته هیدرولیز شده. اگر اینها را روی برچسب می بینید، سعی کنید از این نوشیدنی ها خودداری کنید زیرا می توانند باعث پوسیدگی دندان شوند.

بسیاری از محصولات غذایی با برچسب 'سالم'، 'کم قند'، 'بدون قند افزوده' یا 'گیاهی' ممکن است همچنان حاوی قند باشند.

برای معلومات بیشتر، از بازدیدکننده سلامت خود پرسید یا
www.child-smile.org.uk
مراجعةه کنیده

عنصر اب، گلوكوز، شربت فروتكوز (از گندم و ذرت، رس انگور سیاه از تمکز (6%) شکر،
و یوتامین C، تیتاب/اسید سینیریک.

معلومات غذیه

مقدار های معمول	در هر 100 گرم
انرژی	219 کیلوژول/51 کالری
ردیابی	12.6 گرم
کربوهیدرات	که در آن شکر 12.1 گرم

چربی صفر	که را اشباع می کند
صفر	صفر
صفر	صفر
صفر	صفر
سودیم	و یوتامین سی (24) میلی گرم (RDA 40%). هر خوارک 288 میلی لیتری RDA 115% و یوتامین C را فراهم می کند.

اداره بهداشت عمومی سکاتلند در سکاتلند
یک آژانس ملی است که مربوط به بهبود
و حفاظت سلامتی و تندرسنی مردم
اسکاتلند است.

© Public Health Scotland 2025



این نشریه جواز برای استفاده مجدد دارد
تحت مجوز دولت باز نسخه ۰.۳.v.

برای معلومات اضافی، مراجعت کنید
www.publichealthscotland.scot/ogl

www.publichealthscotland.scot



ترجمه و قالب های دیگری در صورت درخواست موجود اند در:

