



خواره لومړي خوندور

د جامدو خواړو د معرفي کولو لپاره یو اسان لارښود

Pashto version:
Fun First Foods

Public Health
Scotland



نور معلومات او سرچینې

د شیدو سره جامد خواړه ورکولو (ویننگ) او لومړنیو خواړو

په اړه نور معلومات دلته موندلی شئ:

www.parentclub.scot/topics/food-eating/weaning-first-foods



د نورو ترکیبونو نظرونو لپاره، د شیدو سره جامد خواړه ورکولو (ویننگ) په اړه د پځلي کتابونو لپاره خپل کتابتون ته مراجعه وکړئ.

د غوره پیل خواړو (Best Start Foods) په اړه د معلوماتو لپاره، کوم چې د صحي خواړو پیروندو لپاره وړ کورنیو ته ملاتړ چمتو کوي:

www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods

د خپل ماشوم د غاښونو د پاملرنې په اړه د نورو معلوماتو لپاره:

www.childsmile.nhs.scot

که تاسو غواړئ خپل ماشوم د سبزیجاتو خوړونکي په توګه لوی کړئ، نو دا ډیره مهمه ده چې خصوصي معلومات ترلاسه کړئ، نو په دې اړه د خپل روغتیايي پالونکي سره بحث وکړئ.



منځپانگې

- 2 دا کتابچه به ستاسو سره څنگه مرسته وکړي
- 6 پیل کول
- 10 د خوراک خونديتوب
- 11 څه باید وخورئ؟
- 14 پرمختګ
- 18 کوچني خواړه
- 23 ستاسو ماشوم څه څښای شي؟
- هغه خواړه چې د ویننګ (د مور شیدو سره
نور جامد خواړه) په وخت کې یې باید مخنیوی
29 وشي د 6 میاشتو د عمر څخه وړاندې
- 33 ترکیبونه



څنگه دا کتابچه به تاسو سره مرسته وکړي

د والدينو په توگه، تاسو د خپل ماشوم لپاره غوره آغاز غواړئ. هغه څه چې ستاسو ماشوم خوري او څښي د اوس او آنده روغتيا لپاره مهم دي. پدې کتابچه کې معلومات کيدې شي چې توپير ولری له هغه څه څخه چې تاسو مخکې لوستلي وي، يا ستاسو ملگرو او کورنۍ تاسو ته وئيلي وي. د ماشومانو د تغذيې په اړه تل نوې څيړنې ترسره کيږي او پدې کتابچه کې معلومات او مشوره د تازه موندنو پراساس دي. دا به ستاسو ماشوم سره مرسته وکړي چې احتمالي غوره آغاز ومومي.

ويننگ څه شپ دی؟

ويننگ پدې معنی دي چې د ماشوم په رژيم کې د مور شيدو سره سره په تدريجي ډول مختلف نور خواړه شامل کړې شي چې دوی د مور شيدې يا د ماشوم فورمولې سره يوځای صحي خواړه وځوري. ځينې وختونه دې ته 'د جامدو خوړو آغاز' ويل کيږي.

که تاسو د شيدو تغذيه کوئ، تاسو بايد خپل ماشوم ته د جامدو خوړو سره يوځای د مور شيدې ورکړئ. دا به تاسو دواړو لپاره گټه ور وي. که تاسو د خواړو فورموله تغذيه کوئ، د جامدو خوړو سره يوځای لومړو شيدو ته دوام ورکړئ. د لومړيو نهو مياشتو لپاره ستاسو د ماشوم ډيري تغذيه د مور شيدو يا فورموله شوي شيدو څخه راځي.

د شيدو مقدار به کم شي ځکه چې ستاسو ماشوم ډير خواړه اخلي. دا احتمال لري چې تاسو ته خبر درکيږي کله چې دوی د شيدو ورکړې بندولو ته چمتو شي. دوی احتمال لري چې تاسو ته خبر درکيږي کله چې دوی د شيدو ورکړې بندولو ته چمتو وي. که تاسو د ماشوم لپاره د شيدو فورموله کاروئ، نو تاسو بايد د دوی د لومړۍ کليزې وروسته په خلاص يا آزاد جريان پياله کې د پاسټورائز شوي بشپړ يا نيمه سکيم شوي د غوا، وزې يا د گډې شيدو ته واړوئ. د دوی د اړتيا وړ شيدو اندازه به د وخت په تيريدو سره کمه شي.

د جامدو خوړو د معرفي کولو لپاره غوره وخت کله دی؟

د ماشوم د ودې لپاره د جامدو خوړو معرفي کول یو مهم ګام دی. دا د دوی سره د نوي خوندونو او جوړښتونو په اړه زده کړه کې مرسته کوي او د کورنۍ خواړو کې برخه اخلي.

روغتیايي متخصصین سپارښتنه کوي چې د شاوخوا 6 میاشتو په عمر کې جامد خواړه پیل کړئ، کله چې ستاسو ماشوم چمتو وي. تر دې وخته پورې، د مور شیدې یا د ماشوم د خواړو فورموله ټول هغه تغذیه چمتو کوي چې ستاسو ماشوم ورته اړتیا لري. د شاوخوا 6 میاشتو څخه، ماشومان د شیدو د تغذیې سره سره اضافي مغذي موادو ته اړتیا لري، په شمول د اوسپنې. څنګه چې ستاسو ماشوم وده کوي:


✱ په تدریجي ډول د خوړو ډول او مقدار زیات کړئ

✱ د مور شیدې یا د ماشوم فورمولې ته دوام ورکړئ د جامدو موادو سره شاوخوا 12 میاشتو پورې، جامد خواړه باید ستاسو د ماشوم د رژیم اصلي برخه وي. دا د سالم ودې او پرمختګ ملاتړ کوي.

ولې د 6 میاشتو (او له 4 میاشتو څخه مخکې نه) په شاوخوا کې عمر د ویننګ لپاره غوره وخت دی؟

په لومړیو میاشتو کې ستاسو د ماشوم د معافیت سیستم، هاضمي سیستم او پښتورګي لا هم کې وده کوي. نو تر هغه وخته پورې انتظار کول چې دوی شاوخوا 6 میاشتې عمر ولري ترڅو ویننګ پیل کړئ (او د 4 میاشتو څخه مخکې نه) دا د دوی بدن ته وخت ورکوي چې بالغ شي او په خوندي ډول د جامدو خواړو اداره کولو لپاره چمتو شي.

دا په مساوي ډول مهمه ده چې د جامدو خواړو پیل کولو لپاره شاوخوا 6 میاشتو څخه ډیر انتظار ونه کړئ، ځکه چې پدې عمر کې به، ستاسو ماشوم د تغذیې مهم مهارتونه رامینځته کړي او له هغه وروسته به د ودې او پرمختګ ملاتړ لپاره اضافي مغذي موادو ته اړتیا ولري.



د غټو ماشومانو په اړه څه - ایا دوی به ژر جامد خواړو ته اړتیا ولري؟

دا په حقیقت کې مهمه نده چې ستاسو ماشوم د زیزون پرمهال څومره وزن درلود - د هاضمې سیستم، معافیت سیستم او پښتورګي په ورته سرعت سره وده کوي پرته لدې چې د دوی وزن څومره وي. اړتیا نشته چې جامد خواړه ژر معرفي کړئ ځکه چې ستاسو ماشوم د دوی د عمر د نورو ماشومانو په پرتله ډیر وزن لري. که ستاسو ماشوم په هر وخت کې په ځانګړي ډول وزی ښکاري، دوی کیدې شي د ودې چټکتیا ولري او اضافي شیدې ورکول یا د ماشوم فورموله به د دوی اړتیاو پوره کولو لپاره کافي وي. حتی که ستاسو ماشوم د مخکې په پرتله د شپې له خوا خوب نه کوي، هیڅ شواهد شتون نلري چې وړاندیز وکړي چې ژر شیدې ورکول به مرسته وکړي. که تاسو کومه اندېښنه لرئ، نو په اړه یې د خپل روغتیايي لیدونکي یا د کورنۍ نرس سره بحث وکړئ.

ایا زه باید تر هغه وخته پورې انتظار وکړم چې زما ماشوم شاوخوا 6 میاشتې عمر ولري - ایا زه دا مخکې پیل کولی شم؟

ماشومان باید د 6 میاشتو په عمر کې جامد خواړه پیل کړي. دا لارښوونه د تغذیې په اړه د ساینسي مشورتي کمیټې او د سکاټلینډ حکومت د سپارښتنو پر بنسټ ده.


که تاسو ته د دژ نه مخکې د جامد خواړو د معرفي کولو لپاره طبي مشوره درکړل شوې وي، نو تاسو به د ځینو خواړو څخه ډډه کولو ته اړتیا ولرئ. مهرباني وکړئ 29مه پاڼه وګورئ د نور اضافي معلوماتو لپاره.

د وخت نه مخکې پیدا کیدونکي ماشومان

کله چې ماشوم له وخته مخکې پیدا وي، دا پدې مانا ده چې دوی د امیندواری د 37 اونیو ته رسیدو دمخه زیږیدلي دي. د مشورې لپاره د نوي زیږیدلي ماشومانو د خپل ځایي ټیم یا روغتیايي لیدونکي څخه پوښتنه وکړئ چې ستاسو د ماشوم لپاره څه غوره دي.

نور معلومات د BLISS څخه په لاندې پته شتون لري:

www.bliss.org.uk/parents/about-your-baby/feeding/weaning-your-premature-baby





ماته به څنگه پته لگي چې زما ماشوم د جامدو خوړو پيل کولو لپاره چمتو دی؟

هر ماشوم په خپل سرعت سره وده کوي مگر ځينې نښې شتون لري چې نښې چې کله دوی د جامدو خواړو لپاره چمتو کېږي. لکه څنگه چې ستاسو ماشوم 6 مياشتې ته نږدې کېږي (او د 4 مياشتو څخه مخکې نه)، دا مهمه ده چې د ودې نښې وگورئ ترڅو تاسو سره په پريکړه کولو کې مرسته وکړي چې کله چې دوی چمتو کېږي. دا دي:

✱ ستاسو ماشوم کولی شي په ناست حالت کې پاتې شي او خپل سر ټينګ اوچت وساتي.

✱ دوی لاس پورته کولی شي او شيان په سمه توګه ونيولې شي، د بېلګې په توګه، دوی کيدې شي خوړو ته وگوري، پورته يې کړي او خپلې خولې ته يې يوسي په خپله.

✱ د دوی د ژبې انعکاس وده کړې وي چې دوی خواړه ته د خپلې ژبې سره په خپلې خولې کې دننه حرکت وکړي شي پرځای د دې چې خواړه بهر راوباسي. هغه ماشومان چې چمتو نه وي خپل خواړه بيرته بهر راوباسي نو دوی به د خپلې خولې په پرتله په خپل مخ ډير څه خواړه ولري. په يوه يا دوه ورځو کې بيا يو چمچ خوړو وړاندې کولو هڅه وکړئ او انتظار وکړئ تر هغه چې ستاسو ماشوم د دې د تيرولو نښې ښکاره کړي.

که ستاسو ماشوم د ورځې په اوږدو کې د بل چا لخوا پامارنه کېږي، دا بايد اغيزه ونکړي چې تاسو څنگه خپل ماشوم له شيدو څخه خلاصوئ. دوی دې پوهې ته اړتيا لري چې آيا ستاسو ماشوم د ګوتو خواړه خوري، څنگه په خوندي ډول خواړه چمتو کړي او څنگه ډاډ ترلاسه کړي چې ستاسو ماشوم په لوړ څوکۍ کې سم ملاتړ لري. دا هم ډيره مهمه ده چې تاسو ډاډ ترلاسه کړئ چې د کورنۍ هر غړی، ملګری، د نرسري کارمند يا د ماشوم پالنه کوونکی چې ستاسو د ماشوم پالنه کوي پوهه ولري چې په هر وخت کې خواړه وڅاري اود پريښودو دمخه وگوري چې ټول خواړه د ماشوم تير شوي دي.

په ياد ولرئ، دا کتابچه د ويننګ (شيدو ورکولو سره د جامدو خواړو) په اړه خورا تازه معلومات لري. کيدې شي تاسو وغواړئ چې دا د هغه چا سره شريک کړئ چې ستاسو د ماشوم پامارنې کې مرسته کوي.

پیل کول

څنگه به پیل کوی

د ورځې داسې وخت غوره کړئ چې تاسو او ستاسو ماشوم آرام یاست. داسې څه ټاکل شوې سمه طریقه نشته، یوازې هڅه طریقه چې ستاسو او ستاسو ماشوم لپاره مناسبه وي. د څو اونیو وروسته به تاسو یو داسې ترتیب ومومئ چې ستاسو دواړو لپاره به مناسب وي. تاسو به د خپل ماشوم لپاره یو بې (د خوړو په وخت کارول کیدونکې د ماشوم رومال)، یوې نرمې چمچې او یوې کاسې ته اړتیا ولرئ (دا باید پاک وي مگر که ستاسو ماشوم د 6 میاشتو څخه ډیر عمر ولري نو تعقیماً کولو ته اړتیا نلري).



کله چې خواړه خوري، ستاسو ماشوم باید مستقیم ناست وي، په غوره توګه په یوه لوړه څوکه کې چې په خوندي ډول نصب شوی وي او د پښو آرام ولري ترڅو دوی د ښکته کیدو مخه ونیسي. دا به دوی سره مرسته وکړي چې په سمه توګه خواړه تیر کړي او همدارنګه به مرسته وکړي که ستاسو ماشوم غوره ګټې چې د خواړو ډکړې/پرې پخپله پورته کړي. دوی په یوه ځل په خوله کې د ډیر خوراک له اچولو څخه منع کړئ.

څه تمه باید ولري

ماشومان معمولاً زده کوي چې د جامدو خوړو څخه خوند واخلي. هڅه وکړئ چې د ګنده کیدو/ګډوډۍ په اړه اندېښنه ونلرئ. کیدې شي چې ستاسو ماشوم په لومړیو څو ځله کې خواړه توی کړي – دا عادي خبره ده، یوازې انتظار وکړئ او بله ورځ یې هڅه وکړئ. ځینې ماشومان دا په چټکۍ سره زده کوي، ځینې پکې ډیر وخت نیسي. خپل ماشوم د مختلفو جوړښتونو په ورکولو سره وهڅوئ چې خوړه وژوبي.

کیدې شي چې د ماشوم لخواه د یو نوی خواړو د منلو دمخه تاسو ډیری ځله د هغې وړاندیز ته اړتیا ولرئ. ډیر ماشومان په پیل کې ورو ورو خوړل کوي؛ صبر ورته وکړئ او دا په خپل سرعت سره د دې زده کړې ته پریږدئ.

په یاد ولرئ: ستاسو ماشوم دا پوهه لري چې تاسو څنگه احساس کوئ. که تاسو آرام یاست نو ستاسو ماشوم به ډیر په سکون وي.

لومړۍ خواړه

د لومړنيو خوړو لپاره د لاندې وړاندیزونو هڅه وکړئ:

* د امکان تر حده د کورنۍ لپاره د صحي خواړو څخه کار واخلئ - مالګه، بوره يا خوازه مه اضافه کوئ.

* پخې شوې کوټلې/میده سبزیجات لکه بروکولي، گلې، گازره، پارسنپ يا ټیټر.

* میده/پستې شوي میوې لکه کیله، جوش شوي مڼه يا ناک.

* نرمې میوې يا پخې شوي سبزیجات، لکه خټکي يا گازرې، د ټوټو يا گرد شکلونو پرځای په ډکرو کې پرې کيږي.

* د توسټ، ډوډۍ، پیتا ډوډۍ يا چپاتي ټوټې.

* پاستورایز شوي پنیر، جوش شوي يا مکمل یشیدلې هګۍ يا د پخو شویو کبانو ټوټې چې ستاسو ماشوم یې راټولولی شي (په پام کې ونیسئ چې د پخو کبانو ټولې لشبې لرې کړئ).

* د ماشوم لپاره ساده وریچې يا نور حبوبات چې د دوی د معمول خواړو (څرګند شوي د مور شیدې يا فورموله) سره مخلوط شوي وي - تل په یوه کاسه کې، او په بوتل کې نه. که ستاسو ماشوم 6 میاشتې يا ډیر عمر ولري، د غوا پاستورایز شوي شیدې د غلو د دانو سره د مخلوط کولو لپاره کارول کیدی شي، مګر د 12 میاشتو څخه مخکې د څښلو لپاره نه. په 23 مه پاته کې د څښاک په اړه نور اضافي معلومات شتون لري.

ماشومان باید د 6 میاشتو په عمر کې جامد خواړه پیل کړي. که تاسو ته د روغتیايي مسلکي لخوا مشوره درکړل شوې وي چې جامد خواړه ژر تر ژر معرفي کړئ، د نورو معلوماتو او د ډډه کونکو خواړو په اړه لارښوونې لپاره 29 مه پاڼه وگورئ.



پسته شوې کیله




څو ځله او څومره؟

- * هره ورځ يې په يوه ډوډۍ کې د لږ مقدار سره پيل کړئ، يا ميده شوي يا د پکره شوي، او په تدريجي ډول يې اندازه زياته کړئ.
- * د خپل ماشوم اړتياوو ته ځواب ووايې کله چې دوی وږي وي نو خواړه ورکړئ او کله چې دوی پک وي نو ودرؤئ، د مثال په توگه، کله چې دوی خپله خوله وتړي يا خپل سر واړوي.
- * په تدريجي ډول د خوړو مقدار يا اندازه زياته کړئ.
- * د خپل ماشوم د اشتها له مخې لارښود شئ - د مثال په توگه، دوی کيدې شي يو څو چمچې ښه ميده شوي خواړه يا د څو پکرې د خوړو غوښتنه وکړي.
- * خپل ماشوم وهڅوئ چې د خپلو گوتو په کارولو سره خواړه واخلي کله چې دوی ليوالتيا وښايي، نو دوی په هغه څه چې د دوی خولې ته ځي ډير کټرول لري.
- * خپل ماشوم ته د خوړو او جوړښتونو لړۍ ورکړئ، په ځانگړې توگه سبزيجات او ميوه.



- * هغوی مه مجبورؤ چې خواړه واخلي - که داسې ښکاري چې دوی دا نه غواړي، نو وروسته بيا هڅه وکړئ.
- * خپل ماشوم ته وخت ورکړئ چې هر شخوند تير کړي. ډاډ ترلاسه کړئ چې د بل شخوند دمخه د دوی خوله خالي وي. دا مهمه ده چې فعاليت وکړئ د خپل ماشوم په سرعت.
- * هيڅکله د خپل ماشوم په خوړو کې بوره، شات يا مالگه مه اضافه کوئ. مالگه کولی شي د ماشوم پښتورگي ډير بار کړي. بوره ستاسو د ماشوم غاښونو ته زيان رسولی شي او هغه مهم مغذي مواد ناري چې ستاسو ماشوم ورته اړتيا لري.



✱ مصنوعي خواړه د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. که ستاسو ماشوم د کورنۍ خواړه شریکوي، نو ټوله کورنۍ به د لږ مالګې او بورې خوړلو څخه ګټه پورته کړي. 19 مه پاڼه اضافي معلومات لري د کورنۍ خواړو په اړه.

✱ د خپل ماشوم په بوتل کې هیڅ خواړه مه اچوئ ځکه چې دوی به پکې احساس وکړي، لږ خواړه به واخلي او ممکن ټول هغه تغذیه ترلاسه نکړي چې دوی ورته اړتیا لري.

هیڅکله خپل ماشوم د خوراک پرمهال یوازې مه پرېزدئ، چې کیدې شي د هغه ساه بنده شي، او په دقت سره یې څارنه وکړئ.



- سختې یا تار لرونکې میوې او سبزیجات تر هغه وخته پورې پاخه کړئ چې د ګوتو د خوړو په توګه د کارولو لپاره مناسب نرم وي، د خام وړاندې کولو پرځای.

- د میوو او سبزیجاتو څخه ډبرې، ټوټې یا سخت پوستکي لرې کړئ.

- میوې او سبزیجات د ډکرو یا گرد شکلونو پرځای ټوټې ټوټې کړئ.
- د پخې شوې غوښې او کب څخه هډوکي، پوستکي یا تار لرونکي ټوټې لرې کړئ.

- وچه میوه، تخمونه او مونګ پاي په ځمکني شکل، یا د کوچو یا د پیسټ کې معرفي کړئ. بشپړ وچه میوه، تخمونه او مونګ پای باید ماشومانو ته ورنکړل شي ځکه چې کیدې شي دا د ساه بندیدو خطر رامنځته کړي.

- د وچه میوه لرونکو کوچونو د نرمولو لپاره لږې اوبه اضافه کړئ ترڅو جوړښت یې نرم شي.

- خپل ماشوم د مختلفو جوړښتونو په ورکولو سره وهڅوئ چې خوږه وژوي.

- خپل ماشوم په یوه ځل په خوله کې د ډیر خوراک له اچولو څخه منع کړئ.

د ماشوم د ساه بندېدو سره د مقابله په اړه د ویديو او مشورې لیدلو لپاره، لار شئ www.nhs.uk/choking-baby او/یا

www.redcross.org.uk/first-aid/learn-first-aid-for-babies-and-children/choking-baby

د خوراک خونديتوب

- * د خوړو چمتو کولو دمخه خپل لاسونه ومينځئ او د خپل ماشوم لاسونه هم د خوړلو دمخه ومينځئ.
- * ډاډ ترلاسه کړئ چې هغه ساحه چيرې چې خواړه چمتو کيزي پاکه وي. څاروي له دې سيمې څخه لرې وساتئ.
- * د خوړو ورکولو دمخه او وروسته د خوړو ميزونه د پاکې کپړې سره پاک کړئ. ټول کاسې، چمچې، د خوړو پيالې او هر هغه کانتينرونه چې کارول کيزي په گرمو صابوني اوبو کې ومينځئ. تاسو د لوبڼو وينځونکي ماشين څخه کار اخيستلې شئ.
- * ټولې ميوې او سزيجات د کارولو دمخه په ښه توگه ومينځئ. پدې کې له مخکې بسته شوي توکي هم شاملې دي.
- * هر رقم غوښه په سمه توگه پخه کړئ، په ځانگړې توگه چرگ او کيما. ډاډ ترلاسه کړئ چې سره غوښه پکې پاتې نشي، رس يې شفاف وي او دا گرمه وي.
- * ډاډ ترلاسه کړئ چې هر ډول گرم شوي خواړه مخکې له دې چې خپل ماشوم ته يې ورکړئ، وخورئ او ځکه يې وکړئ.
- * ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو د ليکل شوي د کارولو نيتې څخه وروسته خواړه مه کاروئ. د خوړو په ليلونو درج لارښوونې تعقيب کړئ.
- * هغه خواړه چې تاسو چمتو کړي دي په يخچال کې وساتئ (د 5 درجو سانتي گراد څخه ښکته) او په دوو ورځو کې دننه يې وخورئ.
- * کنگل شوي خواړه د بيا تودوخې دمخه په ښه توگه ويلې کړئ او په دې که هيڅ پاتې خواړه بيا مه کنگل کوئ.
- * کله چې خواړه بيا تودوئ، نو هغه تر هغه وخته پورې گرم کړئ چې مکمل گرم شي او خپل ماشوم ته د وړاندې کولو دمخه يې يخ کړئ. يوازې د اړتيا په اندازه خواړه گرم کړئ. د گرم شوو خواړه څخه پاتې شوي ټول غورځوئ.
- * هگۍ بايد د بریتانې د زمري ټاپه ولري يا د بریتانیا د تضمین سکیم څخه وي.

څه بايد وځورئ؟

ويننگ د ځواړو په اړه د زده کړې او په جامدو ځواړو د عادت کولو وخت دی. ستاسو ماشوم به زده کړي چې:

- * ځواړه په مختلفو رنگونو، خوندونو او جوړښتونو کې راځي
- * ځينې ځواړه د چمچ څخه خوړل کيږي، پداسې حال کې چې نور ځواړه د لاسونو سره نيول کيږي او خوړل کيږي شي
- * ځينې څښاک د پيالې څخه کيږي

* تاسو بايد د مور په شيدو تغذيې يا د فورمولې تغذيې (د شيدو پر بنسټ لومړۍ شيدې) ته دوام ورکړئ پداسې حال کې چې په تدريجي ډول جامد ځواړه معرفي کړئ. تاسو بايد خپل ماشوم ته هغه وخت جامد ځواړه ورکړئ کله چې دوی آرام او خوشحاله وي. په لومړي کې، دا کيدې شي د دوی د معمول ځواړو پسې وروسته وي.

د لاندې پنځو خوراكي ډلو څخه داسې ځواړه شته چې مونږ يې بايد هره ورځ وځورو.

آلوگان يا پاستا، وريجې، ډوډۍ او نور نشاسته لرونکي ځواړه

دا ځواړه مهمې سرچينې دي د انرژۍ، ويتامينونو او منرالونو او بايد ستاسو د ماشوم د رژيم يوه لويه برخه وي. په دې گروپ کې د کمې بورې (ساده) د سهارنۍ حبوبات (د مثال په توگه، د غنم حبوبات)، الوگان، خواړه الوگان، دليا، نوډلز، کوسکوس، د شاتو ميوې، نباتات او چپاتيان هم شامل دي.





میوې او سبزیانې

دا د فایر، ویتامینونو او متالونو ښې سرچینې دي چې ستاسو د ماشوم روغتیا لپاره اړینې دي. دا باید ستاسو د ماشوم د رژیم یوه لویه برخه هم وي. تاسو تازه، ټین شوي، وچې او کنګل شوي میوې او سبزیجات کارولی شئ. که تاسو ټین شوي میوه اخلي، نو په طبیعي جوس کې میوه غوره کړئ ځکه چې دا ستاسو د ماشوم د غاښونو لپاره غوره ده پرتله په د شربت کې ټین شوي میوه نه. که تاسو ټین شوي سبزیجات اخلي، نو هغه واخلي چې هیڅ اضافي مالګه پکې نه وي. وچې میوې د ډوډۍ په وخت کې ورکړئ او د ناشتې کې نه، ځکه چې دا ستاسو د ماشوم د غاښونو لپاره هم بد کیدی شي.

نرمې میوې او پخې شوې سبزیجات غوره لومړني خواړه دي. تاسو د کیلې، ناک یا پخه شوي گازرې یا بروکولي د میده کولو هڅه کولی شئ. تاسو همدارنګه دا د ګوتو د خوړو په توګه پرې پرې هم کولی شئ.

د ساه بندیدو خطر کمولو لپاره:

* د وړاندیز دمخه هر ډول ډبرې، پوپونه یا سخت پوټکي لرې کړئ

* کوچنۍ میوې او سبزیجات، لکه چیری رومانجې او انگور، په څلورو مساوي ټوټو کې پرې کړئ

* غټې میوې پرې پرې کړئ د ټوټو کولو پرځای

* سختې یا تار لرونکې میوې او سبزیجات تر هغه وخته پورې پخه کړئ چې د ګوتو د خوړو په توګه د کارولو لپاره خورا نرم وي، د خام وړاندې کولو پرځای



د دې لپاره چې خپل ماشوم د میوو او سبزیجاتو خوړلو ته وهڅوئ، نو پخپله یې وخورئ. ماشوم د خپلو والدينو نقل کول خوښوي.





غوښه، کب، هګۍ، لوبيا، مغز او د پروټين نورې غير لبنياتي سرچينې



دا خواړه ستاسو د ماشوم د ودې او پرمختګ لپاره مهم دي او په کې شامل دي: غوښه، سپين کب، غوړ کب (د مثال په توګه، تازه مکريل، سالمون او ټين شوي سارډين)، چرګ، هګۍ، مغز، مونګ، د ونې مغز (بادام، اخروټ، هيزلنټ، کاجو، پسته، برازيل) او دالونه (لوبيا، نخود، دال او داسې نور). کوورن او توفو هم د پروټين ښې سرچينې دي. د پروسس شويو غوښو څخه ډډه وکړئ، لکه بېکن يا ساسيج، ځکه چې دا په لوړه کچه مالګه لري.

د پخې شوې غوښې او کب څخه هډوکي، پوستکي يا تار لرونکي ټوټې لرې کړئ. ټول مغز لرونکي، تخمونه او مونګ پلي بايد ميده شي يا په نرم، کم مالګه لرونکي کوچو کې وي.

پاستورايښ شوي بشپړ غوړ لرونکي شيدې او نور لبنياتي خواړه



دا خواړه کلشيم لري چې د قوي هډوکو او غاښونو لپاره اړين دي. دا ستاسو ماشوم ته انرژي، پروټين، ويټامينونه او منرالونه هم چمتو کوي. د لبنياتو خواړه د شيدو څخه جوړ شوي، د بيلګې په توګه، پنير او مستې. ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو د پخلي پرمهال د پاستورايښ شوي بشپړ غوړ يا بشپړ لبنياتو محصولات لکه بشپړ غوړ، ساده، غير خواړه مستې يا فروماژ فريس، او د پاستورايښ شوي د غوا شيدې وکاروئ، د بيلګې په توګه، د پنير ساس، کسټر، د وريجو پوډينګ او سيمولين.

غوړ

تر دوه کلنۍ پورې ماشومان د لويو ماشومانو او لويانو په پرتله کوچني معدې لري. دوی داسې خواړو ته اړتيا لري چې انرژي ولري نو په خپلو رژيمونو کې ډير بشپړ غوړ ته اړتيا لري. د دوه کلنۍ وروسته دوی د کورنۍ د نورو غړو په څير په تدريجي ډول د ټيټ غوړ رژيم ته تلې شي. د پخلي لپاره د سبزيجاتو غوړ لکه د زيتون يا لمر گل غوړ، او د سبزيجاتو مارجرين/کوچ (لکه د لمر گل) د ډوډۍ يا په توسټ باندې وکاروئ.

پرمختګ کول

کله چې ستاسو ماشوم د یو څه خوړو خوړلو سره عادت شي، نو دا وخت دی چې لاندې شیانو ته لاس شئ:

- * ډیر خواړه - هره ورځ د یو خواړه څخه ارتقا د دوه او دریو خواړو خوراک ته تلل. تر 12 میاشتو د عمر پورې ستاسو ماشوم کیدې شي درې خواړه او دوه ناشتې ولري.
 - * ډیر خواړه - خپل ماشوم ته د هر خوراکي ګروپ څخه خواړه ورکول (له 11 مې څخه تر 13 مې پانې پورې وګورئ).
 - * ډیر جوړښت - د کوټلې شوي څخه تر ټوټو پورې د کیمیا شوي خواړو ته، د نرمو ډکرو څخه د قوي ډکرو خواړو ته تلل. د پیژندل شوي خواړو سره بل نوي خواړه مخلوط کول، لکه د پستې شوې گازرې یا ټیپر سره دال اضافه کول، کیدې شي دا اسانه کړي.
 - * ډیر مغذي مواد - لکه څنګه چې ستاسو د ماشوم د اوسپنې او نورو مهمو مغذي موادو لپاره اړتیا زیاتېږي. په 17 مه پانه کې نور اضافي معلومات شتون لري.
 - * د خوړو اضافي تجربې - له یوې پیالې څخه څښل او د ډکرو د خوړو د پراخه لړۍ سره ځان تغذیه کول.
- دا پروسه باید ستاسو د ماشوم په سرعت سره ترسره شي. ځینې ماشومان کیدې شي یوازې یو څو چمچ یا څو خولې خواړه وغواړي. خپل ماشوم ته اجازه ورکړئ چې ستاسو له خوا ورکړل شوي شیانو څخه څومره او څه خوړل غواړي غوره کړي، مګر په لوړه څوکۍ کې یې د 20 دقیقو څخه ډیر وخت مه پرېږدئ.

نور اضافي خواړه

کله چې ستاسو ماشوم چمتو ښکاري، نو په ورځ کې یو ځل د جامدو خوړو ورکولو څخه تر دوه او درې ځله پورې پرمختګ وکړئ. ستاسو ماشوم ته باید د دوی د معمول خواړو سره یوځای جامد خواړه ورکړل شي. تاسو کیدې شي وغواړئ چې دوی ته د خوړو سره په یوه پیاله کې د نل اوبه ورکړئ.

په یاد ولرئ چې ټول ماشومان مختلف وي. ستاسو ماشوم به تاسو ته ووايي چې دوی څومره خوړل غواړي او دا کیدې شي د یوې ورځې څخه په بله ورځې توپیر ولري. ټول خواړه باید ستاسو د ماشوم د عمر او مرحلې سره سم چمتو شي - د بیلګې په توګه، خالص، ټوکیدلې، ټوټې شوي، څلور برخې شوي او داسې نور - ترڅو د سا بندیدو خطر څخه مخنیوی وشي. د ځینو لپاره، کیدې شي دا هفته څه وي چې د 10 څخه تر 12 میاشتو پورې عمر لرونکي ماشوم لپاره ورته د ورځې عادي خواړه وښکاري:

ناشته	د کم بورې حبوبات (د مثال په توګه، د غنمو بسکټ یا ساده، یخ شوي، گرم اوټ حبوبات) د کم مالګېن د مونګ پای کوچ، د مور شیدې، د ماشومانو فورمولې یا د پاسچرایز شوي بشپړ غوا شیدو سره (که ستاسو ماشوم 6 میاشتې او ډیر عمر ولري)
د غرمې ډوډک	ډکره شوي یا میده شوي خواړه او د ګوتو خواړه، لکه: • د ټوسټ ټوټو سره پخې شوې لړلې هګۍ یا پخه شوې لوبیا • یا د ډوډکۍ ټوټو سره د کور جوړه شوی د دال او سزيجاتو سوپ/بختي • یا پاستا د روميانو او سزيجاتو ساس سره یا د وریجو سره د چرګانو نرم سالن او سزيجاتو سره • او/یا ټوټه شوې/میده شوې کیله او بشپړ غوړ لرونکي ساده مستې
د شپې ډوډک	ډکره شوي یا میده شوي خواړه او د ګوتو خواړه، لکه: • ټونا (په غوړ یا اوبو کې) او پاستا د خوزو جوارو سره • یا د غوښې کیمیا، یا دال، سره د میده شوو الوګانو او ګازرو یا بروکولي • او/یا د ټانګرین څو ټوټې، په ټین شوي جوس کې - یا تازه، د کسټرډ سره

د مور یا د ماشوم فارمولا شیدې لاهم په لومړیو نهو میاشتو کې د مغذي موادو اصلي سرچینه ده، او له هغې وروسته به ستاسو ماشوم په تدریجي ډول د نورو مغذي جامدو خواړو څخه خوند اخیستل پیل کړي. که تاسو غوره ګڼئ چې ستاسو ماشوم د نباتاتو پر بنسټ یا ویګن رژیم تعقیب کړي، د خواړو سره د شیدو ورکولو په اړه مشوره په لاندې لینک کې موندل کیدی شي:

www.firststepsnutrition.org/vegan-infants



څنگه چې ستاسو ماشوم د خوړو اندازه زیاتوي، دوی به د خپل عادي شیدو کم مقدار ته اړتیا ولري. خو، تاسو باید تر هغه وخته پورې چې وغواړئ د مور په شیدو تغذیه ته دوام ورکړئ یا ستاسو ماشوم باید تر 12 میاشتو پورې هره ورځ شاوخوا 500-600 ملی لیتره د ماشومانو فورموله وڅښي.

اضافی جوړښت

دا به ښه وي چې خپل ماشوم ته ټوټه شوي خواړه ورکړئ. خواړه په مختلفو جوړښتونو کې راځي او دا خواړه به د ژاولو فعالیت په هڅولو کې مرسته وکړي. ډېره خواړه لکه د پخې شوي کاجرو د ډکرو، یا د کرسټ یا ټوسټ کوچنۍ ټوټو هڅه وکړئ.

ویټامینونه

* هر هغه څوک چې عمر یې 5 کاله او پورته وي باید د ویټامین ډي ورځنۍ ضمیمه واخلي، په ځانګړې توګه په ژمي کې.

* د 12 میاشتو څخه کم عمر ماشومانو ته باید په ټول کال کې د ویټامین ډي هره ورځ له 8.5 څخه تر 10 مایکروګرام (ug) پورې ضمیمه ورکړل شي، پرته لدې چې دوی په ورځ کې لږترلږه 500 ملی لیتره د ماشومانو فورموله وڅوري، ځکه چې دا دمخه ویټامین ډي لري. د 1 څخه تر 4 کلونو پورې ماشومانو ته باید هره ورځ د 10 مایکروګرام (ug) ویټامین ډي ضمیمه ورکړل شي. تاسو د والدينو کلب په پاڼه کې د ویټامین ډي د وړیا ضمیمې ترلاسه کولو په اړه نور معلومات موندلای شئ:

www.parentclub.scot/articles/eating-well-at-home

* په سکاټلینډ کې، د روغتیا پال ویټامینونه چې ویټامین ډي لري د ټولو امیندوارو میرمنو لپاره وړیا دي. د ویټامین ډي اضافي مواد د شیدو ورکوونکو میرمنو او تر 1 کال پورې ماشومانو لپاره وړیا شتون لري. تاسو کولی شئ د خپل روغتیايي پالونکي څخه نور معلومات ترلاسه کړئ.

اوسپنه

اوسپنه ستاسو د ماشوم د ودې لپاره اړینه ده او ماشومان د لوییدو سره سم په خپل رژیم کې اضافي اوسپنې ته اړتیا لري. د اوسپنې بډایه خواړه په منظم ډول ورکړئ لکه:

✱ هر رقم غوښه، کنسرو کب، یا هګۍ. د غوښې د کیمې د موادو څخه د خوړو لپاره کار واخلئ لکه د شپون پای (د ترکیب برخه وګورئ). ځیګر ډېر اوسپنه لري خو باید په اونی کې له یو ځل څخه زیات ونه خوړل شي ځکه چې دا ډېر ویتامین A لري


✱ د کم شکر لرونکي ناشتې حبوبات چې اضافی اوسپنه لري

✱ دال، لوبیا او شنه سزيجات هم یو څه اوسپنه لري

د ماشومانو او د دوه کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره ډیر فایر د دوی د کوچنیو ګیدو لپاره ډیر ډکونکي کیدی شي. دا د شیدو او خواړو لپاره د دوی اشتها کمولې شي. نو تاسو باید د ډوډۍ، پاستا، وریجو او غلو ډول چې تاسو خپل ماشوم ته ورکوئ تغیر کړئ او هغوی ته د بشپړ غلې دانې ډیرې مه ورکوئ.

د تعقیب فورمولونه د اوسپنې د یوې ښې سرچینې په توګه په بازار کې موندل کیږي مګر متخصصین موافق دي چې دوی هیڅ ګټه نه ورکوي او اړین ندي.

خپل ماشوم ته د میوو مشروبات، چاکلیټ، خوازه، کرکري او جواړي ناشتې، ژور غوړ/فرايې شوي خواړه، چاکلیټ پوښل شوي بسکټ، پیسټري، چای او کافي مه ورکوئ. دا معمولا په غوړ، بوره او مالګه کې لوړ وي، او په ویتامینونو کې ټیټ وي.





کوچنی خواره



لکه څنگه چې ستاسو ماشوم خپلې لومړۍ کليزې ته نږدې کیږي، تاسو تمه کولی شئ چې هغه به هره ورځ د ټولو خوړو گروپونو څخه د مختلفو خوړو پراخه لړۍ وخورې، لکه:


* هره ورځ د میوو او سبزیجاتو پراخه لړۍ
3-4 خوراگونه

* هره ورځ د نشاسته لرونکو خوړو 3-4
خوراگونه، لکه الوگان، ډوډۍ او وریجې

* د پروټین دوه خوراگونه، لکه غوښه، کب،
هڅۍ او دالونه

* د پاسټورائز شوي لبنیاتو 2-3 خوراگونه،
لکه شیدې لرونکې پوډر، مستې او پنیر

تاسو د احتمالي الرجیانو په اړه معلومات په
30مه پاڼه کې موندلې شئ.



ساده د رومیانو او
سبزیجاتو ساس

څنگه چې ستاسو ماشوم لویږي، دوی کیدې شي د خواړو ترمنځ ناشتې ته
اړتیا ولري، لکه:

* کوچنۍ د نرمه/میده شوي مونځ پاي د
کوچو سینډوچ

* د بادرنګو ډکړې یا د میوو ټوټې

* ډوډۍ د پاسټوریز شوي پنیر سره یا
هوموس



په یاد ولرئ چې خپل ماشوم ته اجازه ورکړئ چې غوره کړي چې ستاسو د
خوړو څخه څومره او څه خوړل غواړي.

د کورنۍ سره یوځای کیدل

د خپل ماشوم سره خواړه خوړل دوی ته ډیر د شمولیت احساس ورکوي، د ټولنیزو مهارتونو په وده کې ورسره مرسته کوي او دوی هڅوي چې د وړوکوالي څخه ښه عادتونه دده کړي. کیدې شي چې دوی ورو وي او ګډوډي رامینځته کړي مګر د صبر هڅه وکړئ. د تلویزیون له مداخلې پرته د کورنۍ سره یوځای خواړه د خوړو په ښه عادتونو هڅولو کې مرسته کوي.

* هڅه وکړئ چې هره ورځ د ورته وخت لپاره د خوړو وختونه تنظیم کړئ - ستاسو ماشوم به بیا پوه شي چې څه تمه ولري او ډیر احتمال لري چې په خوښۍ سره خوراک وکړي.

* داسې څه پاخه کړئ چې ټوله کورنۍ یې وخوري.

* د پخولو پر مهال مالګه یا بوره مه اضافه کوئ (په شمول د شیانو لکه ګریوي او سټاک کیوبونوا). ماشومان باید مالګین خواړه ونه خوري ځکه چې دا د دوی د پښتورګو لپاره ښه ندي او بوره کولی شي د غاښونو د خرابیدو لامل شي.

* د چمتو شویو خوړو او خوراکي توکو کارولو څخه ډډه وکړئ چې مالګه او بوره پکې لوړه وي.

* خپل ماشوم وهڅوئ چې پخپله خواړه وخوري.

* له خپل ماشوم سره خندا او خبرې وکړئ.

* ماشومان د خپلو والدينو د خوړو عادتونه نقل کوي نو په یاد ولرئ چې ښه مثال وړاندې کړئ.

* ماشومان باید تل د خوړو پر مهال ناست وي. که ماشومان د ملاستې، منډه وهلو یا لوبو کولو په وخت کې خواړه خوري، نو د ساه بندېدو احتمال یې ډېر وي.

هغه خواړه چې بوره پکې زیاته وي لږ تر لږه یې ورکړئ او په ندرت سره یې ورکړئ او هیڅکله د خوړو ترمنځ یې مه ورکوئ. خواړه د سزا یا انعام په توګه مه کاروئ.




د ماشومانو لپاره د چمتو شويو خوړو کارول

ځينې وختونه د ماشومانو د خوړو د جاريونو يا کڅوړو کارول اسانه وي مگر په دغو باندې د کور جوړ شوي خواړو ځای مه نيسئ. د کور جوړ شوي خواړه ستاسو ماشوم ته په جوړښت کې ډير تنوع وړاندې کولی شي او دوی به وهڅوي چې ټوټې ومټي.

که تاسو د ماشومانو خواړه اخلي نو په ياد ولرئ:

- * هغه خواړه غوره کړئ چې په لېبل يې ليکلي وي چې اضافی بوره ناري. همدارنگه په لېبل کې د لاندې کلمو څخه هر يو ته پام وکړئ، چې ټول د بورې ډولونه دي: شات، سوگروز، گلوکوز، مالتوز، ډيکستروز، فرکټوز، هايډروليز شوی نشاسته، جوار يا د جوار شربت، مالاس، خام يا نسواري بوره، ټريکل او متمرکز د ميوې جوس. په ياد ولرئ چې شات بايد ستاسو ماشوم ته تر هغه وخته پورې ورنگړل شي چې ترڅو دوی د 12 مياشتو عمر نه وي درلودلې.
- * ډاډ ترلاسه کړئ چې د خواړه د کارولو نيټه نه ده تيره شوې او مهر يې مات شوی نه دی.
- * يوازې هغه اندازه گرم کړئ چې تاسو ورته اړتيا لرئ او هر هغه خواړه چې ستاسو ماشوم يې نه خوري وغورځوئ. ماشومانو ته اجازه مه ورکوئ چې د ماشومانو د کڅوړو نوزلونه په خوله کې واچوي.
- * د پاکو شويو خوړو له کڅوړې څخه څښل خواړه او څښاک هڅوي چې د مخکينيو غاښونو ترمنځ راشي چې د غاښونو د خرابيدو خطر زياتوي. که تاسو د خوړو کڅوړې کاروئ، په ياد ولرئ چې د کڅوړې مواد په يوه کاسه کې خالي کړئ او خپل ماشوم ته د چمچ سره خواړه ورکړئ.
- * د ماشومانو لپاره اخیستل شوي تيار خواړه معمولا د خپلو خواړو جوړولو په پرتله ډير گران وي.
- * د ماشومانو او کوچنيانو لپاره د هټې څخه اخیستل شوي خواړه اړين ندي - دوی گران کيدې شي او په بوره کې لوړ هم.



ایا داسې کوم خواړه شته چې زه یې باید ورنکړم؟

- * ماشومانو ته باید شات، مالګه او بوره د 12 میاشتو څخه مخکې ورنکړل شي.
- * د مغز لرونکو میوو، په شمول د مونګ پلي، څخه باید تر پنځو کلونو پورې ترې پډه وشي ځکه چې د سا د بندیدو خطر پکې شتون لري. خو، د مغز نرم کوچ ستاسو ماشوم ته ورکول سم دي.
- * له ښارګ، مارلین او سورې کب څخه باید مخنیوی وشي. دا ځکه چې په دې کبانو کې د پارې کچه په ماشوم یا د ماشوم د ودې په عصبي سیستم باندې زیان رسونکې اغیزه کولی شي. نور کبان او شیلفش (شیل کب) د شاوخوا 6 میاشتو څخه مناسب دي، مګر خام شیلفش باید ماشومانو ته ورنکړې شي ځکه چې دا د خوړو د زهرې کیدو خطر زیاتوي.
- * ماشومان داسې خوړو ته اړتیا لري چې په کالوري او مغذي موادو کې لوړ وي ځکه چې دوی په لږ مقدار کې خوراک کوي. هغه خواړه چې د ټیټ غوړ یا ټیټ کالوري لرونکي خواړو په حیث په نښه شوي وي پدې مرحله کې مناسب ندي.
- * د ټي ماشومان او نور ماشومان باید خام، غیر پاسچور شوي شیدې او لبنیات، لکه د غیر پاسچور شوي شیدو څخه جوړ شوی پنیر ونه خوري، ځکه چې د خوړو د زهرې کیدو خطر ډیريزي.

خپل ماشوم څنگه د نوي خواړو خوراک ته چمتو کولی شئ؟ بیا بیا هڅه کول غوره لاره ده. هرڅومره چې دوی د نوي خواړه د خوراک هڅه وکړي او هرڅومره چې دوی د کورنۍ نور غړي په خوراک ويني، هومره یې د خوړلو احتمال ډیر وي.



څنگه د خپل ماشوم د ساه د بندېدو مخه ونيسئ

- * تل له خپل ماشوم سره اوسئ او کله چې دوی خواړه خوري نو له نږدې يې څارنه وکړئ.
- * سختې يا تار لرونکې ميوې او سبزيجات تر هغه وخته پورې پاخه کړئ چې د ګوتو د خوړو په توګه د کارولو لپاره مناسب نرم وي، د خام وړاندې کولو پرځای.
- * د ميوو او سبزيجاتو څخه ډبرې، ټوټې يا سخت پوستکي لرې کړئ.
- * ميوې او سبزيجات د ډکرو يا گرد شکلونو پرځای ټوټې ټوټې کړئ.
- * د پخې شوې غوښې او کب څخه هډوکي، پوستکي يا تار لرونکي ټوټې لرې کړئ.
- * مغز، تخمونه يا مونګ پلي په ځمکنۍ شکل، يا د کوچو يا د پيسټ په بڼه کې معرفي کړئ. د مغز لرونکو ميوو، په شمول د مونګ پلي، څخه بايد تر پنځو کلونو پورې ډډه وشي ځکه چې د ساه د بندېدو خطر پکې شتون لري. ټول مغز لرونکي ميوې او مونګ پلي بايد ژر تر ژره معرفي شي.
- * خپل ماشوم د مختلفو جوړښتونو په ورکولو سره وهڅوئ چې خوږه وژويي.
- * کله چې خواړه خوري، ستاسو ماشوم بايد نيغ ناست وي، په غوره توګه په يوه لوړه څوکۍ کې چې په خوندي ډول نصب شوی وي او د پښو آرام ولري ترڅو دوی د ښکته کيدو مخه ونيسي.
- * خپل ماشوم په يوه ځل په خوله کې د ډير خوراک له اچولو څخه منع کړئ.
- * خپل ماشوم ته وخت ورکړئ چې هره ګوله تيره کړي او ډاډ ترلاسه کړئ چې د هغه خوله خالي وي مخکې لدې چې نور خواړه ورکړئ. د خپل ماشوم په سرعت فعاليت وکړئ.
- * خپل ماشوم ته اجازه ورکړئ چې پخپله خواړه وخورې ترڅو پر هغه څه چې خولې ته ځي ډير کنټرول ولري.
- * د کوچنيو ګردو خوړو څخه محتاط اوسئ ځکه چې دوی په ستوني کې نښنېدې شي. خواړه په ډکرو وويشت يا يې پټير په میده کونکي میده کړئ.
- * د پنځو کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د پاپ کارن ورکولو څخه ډډه وکړئ ځکه چې دا د ساه بندېدو خطر لري.
- د ساه بندېدو سره د مقابلې لپاره د خپل روغتيايي پالونکي څخه مشوره وغواړئ. که ستاسو ماشوم اضافي اړتياوې ولري او تاسو د متخصص مشورې ته اړتيا لرئ، د وينا او ژبې معالج سره د خبرو کولو غوښتنه وکړئ.

څه ستاسو ماشوم څښلې شي؟

ستاسو د ماشوم لپاره جامد خواړه او شیدې

تاسو باید خپل ماشوم ته د مور شیدې ورکول یا د ماشوم لومړی فارموله ورکول ته تر هغه وخته پورې دوام ورکړئ چې دوی لټرلږه یو کلن شي. د مور شیدې ورکول به تاسو او ستاسو ماشوم ته تر هغه وخته پورې ګټه ورسوي تر څو چې تاسو دې ته دوام ورکړئ.

څنګه چې ستاسو ماشوم پیر جامد خواړه خوري، د شیدو اندازه چې دوی یې غواړي کميږي. کله چې ستاسو ماشوم په ورځ کې څو ځله جامد خواړه وخوري، نو کیدې شي چې د شیدو خوړل په بشپړه توګه پرېږدي.

د ماشومانو لپاره بیکرونه او پیالې

خپل ماشوم د شاوخوا 6 میاشتو څخه د پیالې یا بیکر څخه د څښاک سره معرفي کړئ او د خوړو سره یو څو ځاڅکي اوبه ورکړئ. د خلاصې پیالې یا د آزاد جریان پیالې کارول چې پرته له سربونښ وي به ستاسو ماشوم سره د څښلو زده کولو کې مرسته وکړي او ستاسو د ماشوم غاښونو لپاره هم غوره دی.

کله چې ستاسو ماشوم 1 کلن شي، نو باید د بوتل څخه تغذیه کول منع شي. کله چې بوتل یا روزونکي پیاله کاروئ، نو د مور شیدې، فارمولا شیدې یا اوبه پرته بل څه پکې مه اچوئ، او په خوړو کې بل څه (د بورې، حبوباتو، کچري یا چاکلیټ پوډر په شمول) مه اضافه کوئ.

د بوتل څخه د خوړو څښاکونو څښل په کوچنیو ماشومانو کې د غاښونو د خرابیدو لامل کیږي. څښاکونه د بوتل د نیپل له لارې پور ورو جریان لري، پدې معنی چې بوره لرونکی ماده به د اوزدې مودې لپاره د دوی غاښونو سره په تماس کې وي.

د ماشوم د غاښونو د پاملرنې په اړه د نورو معلوماتو لپاره، وګورئ: www.childsmile.nhs.scot/parents-carers/oral-health-for-babies-birth-to-3-years-old

د ماشوم د پيالې يا بيكر غوره كول

دا مهمه ده چې د صحيح ډول بيكر يا پياله غوره كړئ. يوه پياله يا بيكر چې د آزاد جريان پوښ ولري (پرته له توييدو والو څخه) د بوتل يا بيكر په پرتله چې نېيل لري غوره دی ځكه چې دا به ستاسو ماشوم سره مرسته وكړي چې د څښلو پرځای گوټ كول زده كړي. هرڅومره ژر چې ستاسو ماشوم چمتو وي، هغه وهڅوئ چې د خلاصې پيالې څخه څښاك ته لاړ شي.

د تي ماشومانو او لوې ماشومانو لپاره څښاك

ټول مشروبات د تي ماشومانو او لويو ماشومانو لپاره مناسب نه وي. لاندې معلومات په دې اړه توضيحات وركوي چې خپل ماشوم ته څه وركړئ او كله.

د مور شيدې

د مور شيدې يوازینی خواړه يا څښاك دي چې ماشومان ورته د خپل ژوند په لومړيو 6 مياشتو کې اړتيا لري. كله چې تاسو شاوخوا 6 مياشتې عمر لرونكو ته جامد خواړه معرفي كوئ، نو بايد د زياتيدونكي متنوع رژيم سره يوځای وركړل شي. د روغتيا نړيوال سازمان سپارښتنه كوي چې ټول ماشومان تر 2 كلونو يا ډير وخت پورې د مور په شيدو تغذيه شي.

تر 12 مياشتو پورې د مور شيدې وركول د غاښونو د خرابېدو د كم خطر سره تړاو لري.

د فارمولې شيدې

معمولا د ماشوم لومړنی فورمولې اساس د غوا په شيدې وي او ستاسو د ماشوم د ژوند په لومړيو 12 مياشتو کې د مور د شيدو لپاره يوازینی مناسب بدیل دی. په انگلستان کې ټولې د ماشومانو فورمولې بايد د ماشومانو د ودې او پراختيا لپاره ورته معيارونه پوره كړي. دا مهمه نده چې تاسو د فارمولې ارزانه يا ډير گران برانډ غوره كړئ.

تعقيبي فورموله د 6 مياشتو څخه كم عمر ماشومانو لپاره مناسب نه ده، او تاسو اړتيا نرئ چې دا د 6 مياشتو وروسته معرفي كړئ. كله چې ستاسو ماشوم 12 مياشتې عمر ولري نو د فارمولې شيدې ته اړتيا ناري. پدې کې د ماشوم لومړی فورموله، تعقيبي فورموله، د ودې شيدې او د کوچنيانو شيدې شاملې دي.



د غوا شیدې د 12 میاشتو څخه د اصلي څښاک په توګه معرفي کیدی شي.

د ماشومانو د فورمول د ډولونو په اړه نور ولولئ په

<https://publichealthscotland.scot/publications/formula-feeding-how-to-feed-your-baby-safely>

د غوا د شیدو پرته فارموله

د وزې د شیدو فورموله شتون لري او د غوا د شیدو فورمولې په څیر ورته د تغذې معیارونو سره سم تولید کیږي. د وزې د شیدو فورموله د غوا د شیدو پروټین لرونکو ماشومانو لپاره مناسب نه ده. الرژي – مهرباني وکړئ 32 پاڼه وګورئ.

ښه شپه شیدې

د "ښه شپه" شیدې د شپږو میاشتو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو لپاره مناسب نه دي. دا ډول فورمولې ته اړتیا نشته، او هیڅ داسې شواهد نشته چې ماشومان د دې له څښلو وروسته ښه آرام کوي یا زیات خوب کوي.

اوبه


کله چې ستاسو ماشوم د جامدو خوړو خوړل پیل کړي (له شاوخوا 6 میاشتو څخه)، تاسو کولی شئ هغه ته د خوړو سره د یوې پیالې یا بیکر څخه د اوبو څو څاڅکي ورکړئ. د 6 میاشتو څخه پورته ماشومانو لپاره د څښاک اوبه جوش کولو ته اړتیا نلري.

په بشپړ ډول د مور په شیدو تغذیه شوي ماشومان تر هغه وخته پورې اوبو ته اړتیا نلري تر څو چې دوی د جامدو خوړو خوړل پیل نه کړي. په ګرم موسم کې دوی کیدې شي چې د معمول څخه ډیر شیدې وغواړي.

د شپږو میاشتو څخه کم عمر لرونکي په فارمولې تغذیه شوي ماشومان کیدې شي د ګرم موسم په جریان کې د جوش شوي یخو اوبو کوچني څاڅکو او همدارنګه د دوی د معمول شیدو تغذیه ته اړتیا ولري.

د اوبو په کارولو سره د ماشوم د فارمولې په خوندي ډول جوړولو معلومات

ومومئ: <https://publichealthscotland.scot/publications/formula-feeding-how-to-feed-your-baby-safely>



د غوا شیدې

د غوا شیدې د شاوخوا 6 میاشتو څخه په پخلي کې کارول کیدی شي یا د خوړو سره مخلوط کیدی شي مگر باید ماشومانو ته د اصلي څښاک په توګه تر 12 میاشتو پورې ورنکړې شي. دا ځکه چې د غوا شیدې ستاسو د ماشوم د اړتیاوو د پوره کولو لپاره د مغذي موادو مناسب توازن ناري.

کله چې ستاسو ماشوم یو کلن شي، پاسچرایز شوي بشپړ شیدې او نیمه سکیم شوي شیدې د اصلي څښاک په توګه معرفي کیدی شي. کم غوړ او 1 فصدې شیدې باید د 5 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د اصلي څښاک په توګه ورنکړل شي ځکه چې دوی کافي کالوري ناري. د ټیټ غوړ شیدې د 1 کلن عمر څخه په پخلي کې کارول کیدی شي.

غیرپاسچر شوي شیدې

کوچني ماشومانو ته باید غیر پاسچر شوي شیدې ورنکړل شي ځکه چې د خوړو د زهري کیدو خطر زیاتوي.

د وزو او ګډو شیدې

د وزو او ګډو شیدې د یو کال څخه کم عمر ماشومانو لپاره د اصلي څښاک په توګه مناسبې ندي ځکه چې د غوا د شیدو په څیر، دوی کافي اوسپنه او نور مغذي مواد ناري چې د دې عمر ماشومان ورته اړتیا لري. تر هغه چې دوی پاسچرایز شوي وي، دوی د اصلي څښاک په توګه کارولیدې شي کله چې ستاسو ماشوم یو کلن شي.

د سویا مشروبات او د شیدو نور بدیلونه

تاسو خپل ماشوم ته د یو کال عمر څخه د صحي متوازن رژیم د یوې برخې په توګه د کلشیم څخه پاک شیدو بدیلونه، لکه سویا، جوار یا بادام څښاک هم ورکولی شئ.

که ستاسو ماشوم د شیدو سره حساسیت یا عدم برداشت ولري، نو د خپل روغتیايي لیدونکي یا GP سره خبرې وکړئ. دوی تاسو ته د شیدو د مناسبو بدیلونو په اړه مشوره درکولی شي.

د وریجو مشروبات

د 5 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید د مور د شیدو، د ماشومانو د فورمولې یا د غوا د شیدو د بدیل په توګه د هټی څخه اخیستل شوي د وریجو مشروب ونه خوري ځکه چې دوی کیدې شي ډیر ارسنیک ولري. دا د وریجو د وړاندیز شوي فورمولې لپاره نه پلي کیږي - 32مه پاڼه وګورئ.

ارسنیک په طبیعي ډول په چاپیریال کې موندل کېږي او زموږ خواړو او اوبو ته هم لاره موندلی شي.

وریجې د نورو غلو په پرتله ډیر ارسنیک جذبوي، مگر دا پدې معنی ندي چې ستاسو ماشوم وریجې نشي خوړلي. په انگلستان کې، په وریجو او د وریجو محصولاتو کې د غیر عضوي ارسنیک اعظمي کچه اجازه لري، او حتی د کوچني ماشومانو د خوړو لپاره سختې کچې ټاکل شوي دي.

که ستاسو ماشوم دمخه د وریجو مشروب خوړلی وي نو اندېښنه مه کوئ. د دوی لپاره سمدستي خطر نشته، مگر دا غوره ده چې د شیدو بل ډول ته واړوئ.

د میوو جوس او نرمه غذا (سموتي)

د میوو جوس، لکه د نارنج جوس، د ویتامین سي ښه سرچینه ده. په هرصورت، دوی طبیعي شکر او تیزابونه هم لري، کوم چې د غاښونو د خرابیدو سبب کېدې شي. د 12 میاشتو څخه کم عمر لرونکي ماشومان د میوو جوس یا سموتي ته اړتیا نلري.

که تاسو غواړئ دا خپل ماشوم ته ورکړئ، نو جوس او سموتي (یوه برخه جوس تر لسو برخو اوبو پورې) نرم کړئ. دوی د ډوډۍ په وختونو پورې محدود کړئ (د خوړو ترمنځ نه) ځکه چې دا به د غاښونو د خرابیدو خطر کمولو کې مرسته وکړي.

له 5 کلنۍ څخه، تاسو خپل ماشوم ته د میوو جوس یا سموتي ورکولی شئ. په ورځ کې له یو ګیللاس (شاوخوا 150 ملی لیتر) څخه زیات مه ورکوئ، کوم به چې د خواړو سره ورکړل کېږي.

اسکواشونه، خوندورې شیدې، 'میوه' یا 'جوس' مشروبات او ګاز لرونکي مشروبات

اسکواشونه، خوندورې شیدې، 'میوه' یا 'جوس' مشروبات او ګاز لرونکي مشروبات د کوچني ماشومانو لپاره مناسب ندي. دوی بوره لري او د غاښونو د خرابیدو لامل کېدې شي، حتی که معتدل هم شي.

د دوی د غاښونو پاملرنه: دا مهمه ده چې د خپل ماشوم غاښونه ژر تر ژره پاک کړئ کله چې لومړی غاښ څرګند شي. کوچني سر لرونکې د غاښونو نرم برش څخه کار واخلئ. د 3 کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره، د غاښونو فلوراید پیسټ په وچ برش باندې وکاروئ.

www.childsmile.nhs.scot

د وړو ماشومانو او لویو ماشومانو لپاره، دا مشروبات به ستاسو ماشوم موږ کړي نو دوی د صحي خوړو لپاره وزی نه وي. د دې پرځای، د خوړو سره د پیالې څخه د اوبو یو څو څاڅکي ورکړئ.

ګاز لرونکي مشروبات تیزابي دي او د غاښونو انیمیل ته زیان رسولي شي نو دوی باید وړو ماشومانو او لویو ماشومانو ته ورنکړل شي.

د وړو ماشومانو او لویو ماشومانو لپاره د رژیم یا کم بوره لرونکي مشروباتو سپارښتنه نه کېږي. حتی کم کالوري او بې بوره مشروبات ماشومان خوړو خوړلو ته هڅولي شي.

سلس یخ مشروبات

د څلورو کلونو او کم عمر لرونکي ماشومان باید د سلس یخ مشروبات ونه څښي، چې ځینې وختونه د سلس په نوم پېژندل کېږي، ځکه چې دوی کیدې شي ډیر ګلیسرول ولري. د سلس یخ مشروبات کیدې شي د ګلیسرین لوړه کچه ولري چې په دوی کې، د بورې پرځای کارول کېږي، ترڅو د سلس اغیز رامینځته کړي.

هغه لوې ماشومان چې ډیر ګلیسرول لري کیدې شي د سر درد ولري یا ناروغه شي. که چیرې دوی ډیر ګلیسرول ولري، نو دا کیدې شي علامات رامینځته کړي لکه د سر درد، د وینې د شکر ټیټوالی (ګلوکوز)، ګډوډي او حتی بې هوښه کیدل.

د 'ماشوم' او نباتاتي مشروبات

د 'ماشوم' او نباتاتي مشروبات معمولاً بوره لري او سپارښتنه یې نه کېږي.

ګرم مشروبات

چای او کافی (قهوه) د کوچنیو یا لویو ماشومانو لپاره مناسب نه دي. که چیرې پکې بوره اضافه شي، نو دا د غاښونو د خرابیدو لامل کیدې شي.

NHS ویب پاڼې څخه معلومات – www.nhs.uk/baby/weaning-and-feeding/drinks-and-cups-for-babies-and-young-children – د 2026 کال د جولای په لومړۍ نیټه. د عامه سکتور معلومات لري چې د خلاصې حکومتي اجازې v3.0 www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 لاندې جواز لري –

خواره چی د ویننگ (د مور شیدو سره نور جامد خواره) په وخت ترې باید ډډه وشي د 6 میاشتو د عمر څخه وړاندې

که تاسو د 6 میاشتو څخه مخکې جامد خواره ورکول پیل کړئ، نو لاندې خواره باید له رد کړې شي، په شمول د تیارو خواړو (د پاکټ) د اجزاو په توګه.

* غیر پاسچر شوي شیدې، مستې یا پنیر – دا باید هیڅکله ماشومانو یا د تي ماشومانو ته په هیڅ مرحله کې هم ورکړل شي.

* ځیګر او د ځیګر محصولات (لکه پیټی).

* مغزي میوې او تخمونه.

* شات (په یاد ولرئ چې شات باید ستاسو ماشوم ته تر هغه وخته پورې ورکړل شي چې ترڅو دوی د 12 میاشتو عمر نه وي درلودلې).

* سیلفش (سیل کب)

ټول ماشومان تر 12 میاشتو پورې د مور شیدې یا د ماشوم فورمولې ته د خپل اصلي څښاک په توګه اړتیا لري. د شیدو سره جامد خواړو ورکولو (ویننگ) په لومړیو مرحلو کې، د مور د شیدو یا د فورمولې د معمول ورځني مقدار سربیره به لږ مقدار جامد خواره ورکړل شي او تاسو به په تدریجي ډول د مور شیدې یا فورموله کم کړئ. که تاسو د 6 میاشتو څخه مخکې جامد خواره ورکوئ، نو په ډیره کمه اندازه یې ورکړئ. تاسو به اړتیا ولرئ چې خواره په نرم او نري ثبات کې جوړ کړئ. د پیل کولو لپاره مناسب خواره ساده کچري (وریجې) چې د مور شیدو یا د ماشوم فورمولې سره مخلوط شي او په یوه کاسه کې (هیڅکله په بوتل کې نه)، میده شوي سبزیجات لکه پالک، کدو، یا ګازره، یا میده شوي میوې لکه ایوګاډو، ناک یا کیله دي. بیا د نورو خورو سره پرمختګ وکړئ.

تر هغه چې ستاسو ماشوم 6 میاشتې عمر ولري، د چمچ تغذیه کولو ټول وسایل باید په ګرمو صابوني اوبو سره په بشپړه توګه پاک شي او په احتیاط سره وچ شي، یا په ډش واشر (د لوښو مینځلو ماشین) کې ومینځل شي، یا تعقیم شي. هغه



اندازه چې تاسو يې ورکړئ بايد ستاسو د ماشوم د اشتها له مخې رهبري شي. دا مهمه ده چې له 6 مياشتو څخه د میده شوو خواړو څخه پاسته شوو او ډیر غوټیو خواړو ته لار شئ ځکه چې ستاسو ماشوم د چمچ څخه د خواړو خوړلو عادت کيزي.

ماشومانو ته بايد هيڅکله د 4 مياشتو (17 اونيو) څخه مخکې جامد خواړه ورنکړي شي.


د الرجي مخنيوی

کله چې تاسو خپل ماشوم ته د شیدې سره جامد خواړه ورکول پیل کوئ، نو سپارښتنه کيزي چې تاسو په یو وخت کې د یو نوی خواړه هڅه وکړئ - مطلب، یو نه زیات خواړه مه سره گډوئ - تر هغه چې انفرادي خواړه ستاسو د ماشوم په رژیم کې ښه ځای په ځای شي.

ستاسو د ماشوم لپاره الرجين لرونکي خواړه چې هڅه یې وکړئ

د شیدو سره جامد خواړه ورکولو له لومړیو مرحلو څخه په منظم ډول په رژیم کې د لاندې خواړو معرفي کول او ساتل د الرجي مخنيوي کې مرسته کولی شي: مونگ پاي، هگي، د غوا شیدې، غنم، د ونو مغز (بادام، اخروټ، هزلنټ، کاجو، پسته، برازیل) سویا، کب او کنجد (تاھیتی).

د دې خواړو د معرفي کولو لپاره د وړاندیزونو لپاره مخامخ جدول وگورئ.



الرجين	د چمچي سره د تغذيه کولو نظريات	د گوتو د خوړو نظريات
مونگ پلي	د مونگ پلي کوچ په دليا، حبوباتو يا مستو کې گډ کړئ	د مونگ پلي کوچ په ټوسټ، کريکر، پف يا د وريجو په کيک باندې واچوئ
هگئ	پسته شوې، لړلې شوې يا يشيدلې هگئ	آملېټ، پين کيک، هگئ لرونکې ډوډۍ يا فريټاټا
د غوا شودې	مستې يا د غوا شيدې چې په دليا يا غلو کې مخلوط شوي وي	پنير لرونکې آملېټ، کيوساډيلا يا فريټاټا. په ټوسټ، کريکر، پف يا د وريجو کيکونو باندې خپور شوی نرم پنير
غنم	د غنمو پر بنسټ غله جات	ټوسټ، پين کيکونه، مافين، کيوساډيلا يا ښه پخه شوي پاستا
د ونو مغزي ميوه (وچه ميوه)	بادام په دليا، حبوباتو يا مستو واچوئ. د کاجو يا بادامو کوچ په دليا، غلو يا مستو کې گډ کړئ	د کاجو يا بادامو کوچ په ټوسټ، کريکر، پف يا د وريجو په کيک باندې واچوئ
سويا	پوست شوي د اډامام لوبيا يا توفو. په وريجو کې مخلوط شوی کم مالګين سویا ساس	د ټوسټ ترخځې (ډاډ ترلاسه کړئ چې د ډوډۍ اجزا سویا ولري)
کب	وچ يا غور کب، يا شيلفش چې په الوګانو کې پوست شوی وي يا سبزيجات	د کب ترخځې يا د کب کيکونه
کنجد (سيسم)	تاهينې يا هوموس (ډاډ ترلاسه کړئ چې اجزا کې کنجد ولري) په سبزيجاتو کې میده شوي.	تاهينې يا هوموس (ډاډ ترلاسه کړئ چې اجزا کې کنجد ولري) په ټوسټ، کريکر، پف يا د وريجو په کيک باندې اچول شوې

کله چې تاسو مغز، مونگ پلي يا تخمونه وړاندې کوئ نو بايد میده شوې وي ترڅو د سا بنديدو مخه ونیول شي. په 22مه پاڼه کې د سا بنديدو د مخنيوي په اړه نور اضافي معلومات شتون لري.

که ستاسو ماشوم اکزیما ولري

خواره او د شیدو سره د جامد خوړو ورکول د ګډوډي/ګند سبب کېدی شي. که ستاسو ماشوم اکزیما یا حساس پوستکی ولري، نو باید د ماشوم د نازک پوستکي سره د مستقیم تماس مخنیوي لپاره یو موټی خنډ کریم تطبیق شي، تر هغه چې خواره د خولې لخوا ښه زغمل شوي ثابت شوي نه وي، یعنې هیڅ عکس العمل نه وي.

سپارښتنه کيږي چې خواره په مستقیم ډول په پوستکي ونه لگوئ مخکې لدې چې د خولې له لارې یې معرفي کړئ.

د غوا د شیدو د پروټین الرجی (CMPA)

که ستاسو ماشوم د روغتیايي مسلکي لخوا د CMPA سره تشخیص شوی وي، نو کیدې شي تاسو ته مشوره درکړل شي چې د شیدو ورکولو ته دوام ورکړئ یا وړاندیز شوی د شیدو څخه پاکه فارموله وکاروئ. مهرباني وکړئ په یاد ولرئ، د وزې د شیدو فورموله او د لیکټوز نه پاکه فارموله د CMPA لرونکو ماشومانو لپاره مناسب ندي. د سیمه ایز ماشومانو د رژیم ځانګې لخوا به د شیدو څخه پاک معلوماتو لپاره ستاسو ملاتړ وشي.

مهرباني وکړئ دا هم په یاد ولرئ، چې د شیدو څخه پاکه فارموله کې د وریجو د شیدو فارموله شامل کېدی شي – دا د سوپر مارکیټ څخه د وریجو د شیدو مشروب سره تړاو نلري. د وریجو د شیدو فارمولا ارسینیک نلري او د شیدو څخه پاکه خوندي فارموله ده چې وړاندیز کېدی شي.

د پوستکي رطوبتي او نرمونکي کریمونه

د هغو امولینټانو څخه ډډه وکړئ چې د اکزیما ماشومانو لپاره د خوړو پروټینونه لري. دا مهمه ده، په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره، چې د پوستکي پامرې محصول، رطوبت ورکوونکی، نرموونکی یا غوړ باید د خوړو احتمالي الرجین ونه لري، د بیلګې په توګه، جوار، سویا، ارچیس (مونګ پای). دا ځکه چې دوی کیدې شي د مات شوي پوستکي خنډ په سبب حساس شي او بیا په حقیقت کې د دې خوارو سره حساسیت رامینځته کړي.

همدارنګه، د موټسچرائز لګولو او د ماشوم مساج کولو دمخه او په جریان کې د لاسونو په احتیاط سره مینځل ډاډمن کړئ.

مرستې ته اړتیا لري؟ که تاسو فکر کوئ چې ستاسو ماشوم د خوړو په وړاندې احتمالي غبرګون ښودلې دې، نو خپل روغتیايي لیدونکي یا GP سره اړیکه ونیسئ. هغه څه ولیکئ چې پېښ شوي وی او هغه خواره بیا مه ورکوئ پرته لدې چې درته مشوره درکړل شي.

ترکیبونه

په یاد ولری: د خپل ماشوم په خوړو کې بوره یا مالګه مه اضافه کوی. که تاسو باوري پخای نه کوئ نو د خپل روغتیايي لیدونکي څخه په خپله سیمه کې د پخاي ټولګیو په اړه پوښتنه وکړئ.

ټول ترکیبونه د بخولو لپاره مناسب دي پرته لدې چې بل ډول تاکید وشي. کله چې خواړه ساره شي نو په کوچنیو کاسو کې یې یخ کړئ.

د امکان تر حده موسمي میوې او سبزیجات وکاروئ ځکه چې دوی ارزانه او خوندور وي. خواړه باید د ماشوم د عمر او مرحلې لپاره چمتو شي - د مثال په توګه، د اړتیا سره سم پاکول، مسح کول او ټوټې کول - ترڅو د سا د بندیدو د خطر څخه مخنیوی وشي. په 22مه پاڼه کې د سا د بندیدو د مخنیوي په اړه نور معلومات شتون لري.

د دال او آلو میښ/میده شوي (4-5 برخې جوړوي)



50 ګرامه (4 چمچې) سره دال، مینځل شوي
1 متوسط آلو، چې پوستکي یې لرې شوی وي او په کوچنیو ټوټو کې شوی وي

طریقه:

- دال په یوه لوبښي کې واچوئ. 300 ملی لیټره اوبه ورواچوئ او جوش یې کړئ. د پوښ سره یې پټ کړئ او د 10 دقیقو لپاره یې پاخه کړئ.
- آلوګان په ورته لوبښي کې واچوئ او د نورو 15 دقیقو لپاره یې پاخه کړئ. تر هغه وخته پورې یې پخوئ چې مخلوط نرم شي، که مخلوط په لوبښي انځلي نو نورې اوبه اضافه کړئ.
- مخلوط د چاڼ په کارولو سره وچ کړئ مګر مایع یې وروسته د اضافه کولو لپاره وساتئ.
- مخلوط د پخاي مایع په لږ مقدار سره میده کړئ. که مخلوط ډیر ټینګ وي نو نوره مایع اضافه کړئ.

- د مایعاتو کچ کول:
- 1 د وریجو چمچ 15 ملی لیتره دی
- 1 د خوزو چمچ 10 ملی لیتره دی
- 1 د چاپی چمچ 5 ملی لیتره دی

پخه شوې مڼه د زردالو سره (2-3 برخې جوړوي)



- 1 د خوړلو مڼه، سپینه شوې او ښه ټوټه شوې
- 5 کنډ شوي زردالو (په طبیعي جوس کې، شربت کې نه)، ټوټې ټوټې شوې
- 2 چمچې اوبه

طریقه:

- مڼې او زردالو په یوه ساسپین کې د اوبو سره واچوئ او په نرمۍ سره یې تر هغه وخته پورې پاخه کړئ چې میوه نرمه شي. که اړتیا وي، د پخلی کولو برمهال لږې نورې اوبه اضافه کړئ ترڅو د وچیدو مخه ونیول شي.
- ښه یې میډه کړئ.

د سالمې کب او آلو پائی (3 برخې جوړوي)



- 100 گرامه بې پوستکي د سالمې فلیټ
- 2 برابر/درمیانې الوگان، سپین او ټوټې شوي
- 6 د خواړو چمچې پاسچرایز شوي بشپړ شیدې - د خوند لپاره یو څه پاسچرایز شوي پنیر اضافه کړئ

طریقه:

- سالمې په یوه لوبڼي کې واچوئ او په شیدو یې پټ کړئ. کب په نرمۍ سره جوش کړئ تر هغه چې کب په اسانۍ سره د فورک سره ټوڅه شي.
- سالمې لږې کړئ مگر شیدې وساتئ ترڅو وروسته الوگانو ته اضافه شي.
- الوگان د جوش اوبو په یوه لوبڼي کې د 10 دقیقو لپاره پاخه کړئ یا تر نرمیدو پورې. د سالمې څخه لږې شوو شیدو کې یې میډه او وچ کړئ. که اړتیا وي نو د ثبات د تنظیم لپاره لږ نورې شیدې اضافه کړئ.
- کب ټوټې ټوټې کړي او په الوگانو کې واچوئ - یا یې په جلا توگه وخورئ.



د روميانو او سبزيجاتو ساده ساس (د ساس 8 برخې جوړوي)

دا ساده ساس د پاستا سره د کارولو لپاره جوړ کړئ.

د سبزيجاتو غوړ 1 چمچ

1 وړوکې پياز، سپين شوې او ښه ټوټه شوې

$\frac{1}{2}$ سره مرچ، مينځل شوي، تخم ترې لرې شوي او ښه ټوټه شوي

$\frac{1}{2}$ ټينډه، مينځل شوي او ښه ټوټه شوي

400 گرامه ټوټې شوي روميان په جوس کې کنډ شوي

طريقه:

- غوړ گرم کړئ او پياز په نرمۍ سره د 5 دقيقو لپاره په ټيټ تودوخه نرم کړئ، په دوامداره توگه وخورئ.
- مرچ او ټينډې اضافه کړئ او په ټيټ تودوخه کې د نورو 5 دقيقو لپاره پaxe کړئ. دوامداره يې وخورئ.
- روميان ور اضافه کړئ، په پوښ يې پټ کړئ او د 15 دقيقو لپاره يا تر هغه وخته پورې يې پaxe کړئ چې سبزيجات نرم شي، کله ناکله يې لړئ.

د پاستا او پنير سره پيش کولو لپاره:

15-20 گرامه (2 د خوزو چمچې) کوچني پاستا شکلونه

1 چمچ ميده شوی، پاسچرايز شوی، بشپړ غوړ لرونکی چيدر پنير

طريقه:

- پاستا د بسته بندۍ/پاکټ لارښوونو سره سم پخه کړئ.
- اوبه وچې کړئ او د 2 چمچو د روميانو او سبزيجاتو ساس سره يې وخورئ او پنير پرې د پاسه واچوئ.

تغير: کله چې تاسو پياز نرموئ نو 200 گرامه (8 اونس) کيما شوي غوښه اضافه کړئ او د بولونيز ساس جوړولو لپاره پاتې ترکيب تعقيب کړئ. دا به د ترکيب د برخو شمير زيات کړي.

د دال او سبزیجاتو ملائداره قورمه (قورمه 7 برخې جوړوي)



- د سبزیجاتو غوړ 1 چمچ
1 وړوکې پیاز، سپین شوې او ښه ټوټه شوې
1 کوچنۍ گازره، پاکه شوی، او باریک کټ شوی یا ښه ټوټه شوی
100 گرامه (8 چمچې) ټوټه سره دال
1/2 د چای چمچ نرم کري/قورمې پوډر (پیسټ نه)
200 ملی لیتره اوبه
1 کوچنۍ ډبې پاسچرایز شوی، بشپړ غوړ لرونکی، طبیعي مستې

طریقه:

- غوړ گرم کړئ او پیاز په نرمۍ سره د 5 دقیقو لپاره نرم کړئ.
- گازرې، دال او کري پوډر ورسره ګډ کړئ.
- اوبه اضافه کړئ، وخورئ او جوش ته ورکړئ. د یونس سره یې پټ کړئ ،
تودوخې کم کړئ او د 15 - 20 دقیقو لپاره یې په دم کړئ. په دوامداره توګه
یې وخورئ (ځکه چې دا په اسانۍ سره په لوبښي پورې نڅلي) او که اړتیا وي
نو لږ نورې اوبه اضافه کړئ. مخلوط باید ډېر ټینګ وي خو وچ نه.
- کله چې دال نرم شي، له اور څخه یې لرې کړئ او طبیعي مستې پکې
واچوئ.
- د اړتیا سره سم یې پوست/میده کړئ او د جوش شویو سپینو وریجو سره یې
وخورئ.

تغیر: د چرګ یوه کوچنۍ سینه چې پوستکي یې لیرې شوي وي یا د قورن (کب) فلیټ،
ښه ټوټه شوی، په پیل کې د پیاز سره یوځای په غوړ کې اضافه کیدی شي.



د پیروي واله دال او
د سبزیجاتو قورمه



کاتیج پائی د میښ سره (6 برخې جوړوي)



100 گرامه د غوا د غوښې کيما یا د پسه، چرگ، د خنزیر د غوښې کيما یا قورن
1/2 کوچنی پیاز، ښه ټوټه شوی
1 کوچنی گازره، پاکه شوی، او باریک کټ شوی
1 چمچ منجمد نخود
4 درمیانہ الوگان یا خوازه الوگان، سپین شوي او په څلورو مساوي ټوټو کې
پرې شوي
1-2 چمچ پاسچرایز شوي شیدې

طریقه:

- د غوښې کيما او ټوټه شوې پیاز په یو کوچني لوبښي کې واچوئ او په کم تودوخې یې پوخ کړئ تر هغه چې غوښه نسواري شي. 2-3 چمچې اوبه او کټ شوی گازرې اضافه کړئ. پوښ یې کړئ او د 15-20 دقیقو لپاره یې په کم تودوخې پوخ کړئ. د پخلي وخت له پای ته رسیدو څخه 5 دقیقې مخکې نخود ور اضافه کړئ.
- کله ناکله یې وخورئ، د اړتیا په صورت کې نورې اوبه اضافه کړئ.
- الوگان په یو لوبښي کې په اوبو کې پټ کړئ او په لوبښي باندې یې پوښ واچوئ. تر نرمېدو پورې یې پaxe کړئ. که اړتیا وي نو نورې اوبه اضافه کړئ. بیا یې وچ کړئ او د 1-2 چمچو شیدو سره یې میډه کړئ.
- کله چې قیمه پخه شي، نو د میښ (نده شوي الوگانو) سره یې وخورئ.



بریل/د ږندو
لپاره چاپ



لوی چاپ



سمعي/غږيز



بي ایس ایل
(BSL)



اسانه لوستنه



ژباړنې

ژباړې او نورې بڼې د غوښتنې پر اساس شتون لري:

[@phs.otherformats@phs.scot](mailto:phs.otherformats@phs.scot)



0131 314 5300



اعتراف

د الرجی په اړه د معلوماتو لپاره د اډینبورگ د ماشومانو او ځوانانو لپاره د شاهي روغتون کې د NHS لوتیان د څو اړخیز ټیم د الرجی کلینیک څخه مننه.

د سکاټلینډ د عامې روغتیا اداره د سکاټلینډ یوه ملی اداره ده، لپاره د سکاټلینډ د خلکو د روغتیا د ښه والي او هوساینې د ساتنې

Public Health Scotland 2026 ©

OGL

دا خپرونه د بیا کارولو لپاره جواز لري
د روڼر دولتي جواز v3.0. لاندې.
د نورو معلوماتو لپاره، لیدنه وکړئ
www.publichealthscotland.scot/ogl

www.nhsinform.scot/readysteadybaby

www.publichealthscotland.scot